

Вэладент 

Гайд по пульпиту

Всё, что нужно знать,
про лечение пульпита




Содержание

Пульпит.....	3
Причины появления пульпита.....	4
Симптомы.....	4
Возможные осложнения.....	5
Способы лечения пульпита.....	6
Этапы лечения пульпита.....	6
Рекомендации после лечения.....	7
Контакты.....	8

1. Пульпит

Пульпит возникает как у детей, так и у взрослых. Часто заболевание замечают только на острой стадии, когда боль трудно игнорировать. Но пульпит опасен и дает серьезные осложнения без лечения.

Пульпит – воспаления пульпы или нервно-сосудистого пучка внутри зуба. Это воспаление опасно близостью к корню зуба и тем, что именно из-за него появляется повышенная чувствительность. У детей заболевание быстро прогрессирует, переходя в острую стадию, поэтому необходимо немедленно обратиться к специалисту. Чаще всего пульпит – это осложнение после кариеса.



2. Причины появления пульпита

-  Старая пломба
-  Не плотное прилегание пломбы
-  Неудовлетворительная гигиена полости рта
-  Травма
-  Последствие инфекционных заболеваний
-  Наследственная предрасположенность к быстрому развитию кариеса

3. Симптомы

Симптомы воспаления зависят от стадии развития.

-  В хронической форме пульпит протекает практически бессимптомно. Возможна ноющая боль и реакция на горячее и холодное. Но ощущения достаточно быстро проходят, поэтому многие их не запоминают.
-  В острой стадии боль сильнее и возникает намного чаще, часто в вечернее и ночное время. Зуб становится чувствительней и реагирует на горячее и холодное. Боль может отдаваться в ухо, висок и соседние зубы.

4. Возможные осложнения

- Периодонтит – самое частое осложнение после пульпита. Воспаление спускается ниже, до тканей периодонта.
- Также периодонтит может возникать из-за сложной анатомии корней, в результате чего усложняется их инструментальная обработка.

Пульпит – одно из самых частых заболеваний, с которым сталкиваются и взрослые, и дети. Стоматологи-терапевты успешно лечат его с применением современного оборудования. Но необходимо вовремя обратиться к специалисту до развития воспаления.

Стадии развития




поверхностный
кариес



глубокий
кариес



пульпит



периодонтит

5. Способы лечения пульпита



Консервативный – стоматолог препарирует кариозную полость и заполняет каналы специальным составом, а затем устанавливает временную конструкцию. Спустя несколько дней установят постоянную пломбу. При таком способе частично или полностью сохраняется пульпа, поэтому чаще всего стоматологи стараются вылечить зуб именно так.



Удаление пульпы – при таком способе после препарирования и обработки пульпа удаляется, а затем полость заполняется специальными пастами и ставится сначала временная и после постоянная пломба. В некоторые случаи поражения зуба слишком объемное, поэтому специалист предлагает установить вкладку или штифт. В будущем возможна установка коронки на поврежденный зуб

Выбор метода зависит от возраста пациента, степени воспаления и состояния самого зуба. Специалист выберет оптимальный способ для сохранения зуба.

6. Этапы лечения пульпита



Диагностика. Специалист проведет визуальный осмотр и направит на необходимые рентгеновский исследования. На основе снимков специалист поймет степень поражения и составит план лечения.



Лечение пульпита. Стоматолог проводит лечение выбранным способом. Лечение всегда проходит с применением комфортного метода обезболивания. При появлении дискомфорта немедленно сообщите об этом стоматологу.



Установка постоянной пломбы. Чаще всего для лечения необходима два посещения. На первом происходит основное лечение, на втором – установка постоянной конструкции и планирование следующих шагов.



Профилактика. Теперь необходимо тщательно следит за вылеченным зубом и в случае неприятных ощущений даже спустя долгое время после лечения нужно обратиться к специалисту.

7. Рекомендации после лечения

-  Первое время после процедуры сохраняется дискомфорт – от анестезии и манипуляций врача с корневыми каналами. Ощущения постепенно проходят за несколько часов.
-  После установки временной пломбы в некоторых случаях рекомендовано не употреблять напитки и еду в течении 2-х часов.
-  Примерно неделю после процедуры возможен дискомфорт при жевании и небольшая ноющая боль. Если симптомы наоборот нарастают и сохраняются дольше этого срока, необходимо немедленно обратиться к врачу.
-  Соблюдать домашнюю гигиену и посещать профессиональную гигиену полости рта для профилактики появления новых воспалений.





Контакты

 +7 (351) 246-77-77

 veladent.ru

 [veladent](https://vk.com/veladent)

